

Pakendi infoleht: teave kasutajale

VERMOX 100 mg tabletid Mebendasool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on VERMOX 100 mg tabletid (edaspidi VERMOX) ja milleks neid kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne VERMOX'i võtmist
3. Kuidas VERMOX'it võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas VERMOX'it säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on VERMOX ja milleks seda kasutatakse

VERMOX on näidustatud *Enterobius vermicularis*'e (naaskelsaba), *Ascaris lumbricoides*'e (solkmed), *Trichuris trichiura* (piuglane), *Ancylostoma duodenale* ja *Necator americanus*'e (kidaussid) poolt põhjustatud ühe infestatsiooni või segainfestatsioonide raviks.

VERMOX on näidustatud täiskasvanutele ja lastele.

2. Mida on vaja teada enne VERMOX'i võtmist

Ärge võtke VERMOX'it

- kui olete mebendasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne VERMOX'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke alati VERMOX'it täpselt nii, nagu arst on teid juhendanud ja pidev meditsiiniline jälgimine on vajalik kuni sümptomite taandumiseni (nt tuleb uurida väljaheidet).

Lapsed

Alla 1-aastaseid lapsi ei tohi VERMOX tablettidega ravida, välja arvatud juhul, kui raviarst on seda otseselt käskinud.

Muud ravimid ja VERMOX

Teatage oma arstile või apteekrile kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Mebendasooli ja metronidasooli samaaegset kasutamist tuleb vältida tõsiste kõrvaltoimete riski tõttu. Teiste ravimite (nt tsimetidiini) samaaegne kasutamine võib mõjutada VERMOX'i toimet, seepärast küsige sellistel juhtudel nõu oma arstilt.

VERMOX koos toidu ja joogiga

VERMOX'it on soovitatav võtta pärast sööki.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal võib VERMOX'it võtta vaid erandjuhtudel vastavalt arsti juhistele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

VERMOX ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

VERMOX sisaldab laktoosi.

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas VERMOX'it võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamise ja ravi kestuse peab määrama arst vastavalt nugiussi liigile.

Soovitatav annus on järgmine:

Enterobiaas:

Nii täiskasvanutele kui ka lastele alates 1 aasta vanusest 100 mg (1 tablett) ühekordse annusena. Järgides arsti juhiseid võib ravi vajadusel 2...4 nädala pärast korrata.

Askariaas, trihhuriaas, ankülostomiaas ja segainfektsioonid:

Nii täiskasvanutele kui ka lastele alates 1 aasta vanusest 200 mg ööpäevas (1 tablett hommikul ja 1 tablett õhtul) kolmel järjestikusel päeval.

Tablett tuleb alla neelata tervena vähese koguse veega pärast sööki.

Lahtistid või spetsiaalne dieet ei ole ravi ajal vajalikud.

Kasutamine lastel

Enterobiaasi, askariaasi, trihhuriaasi, ankülostomiaasi või segainfektsioonide korral on annus sama mis täiskasvanutel.

Kui te võtate VERMOX'it rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud liiga palju tablette, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Kui olete juhuslikult sisse võtnud rohkem tablette, kui arst on teile määranud, võivad ilmneda kõhukrambid, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Pikka aega suuremate annustega ravitud patsientidel on harva teatatud pöörduvatest maksaprobleemidest, hepatiidist (maksapõletik) ja neeruprobleemidest.

Spetsiifilist antidooti (vastumürki) ei ole. Esimese tunni jooksul pärast sissevõtmist võib teha maoloputust. Vajadusel võib manustada aktiveeritud sütt.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kliinilistes uuringutes täheldati harva ebamugavustunnet alakõhus, kõhupuhitust, kõhulahtisust ja löövet.

Turuletulekujärgse kogemuse käigus on teatud väga harva (võib esineda vähem kui 1-l ravitud patsiendil 10 000-st) neutropeeniat (teatud tüüpi valgete vererakkude arvu vähenemine), allergilisi reaktsioone (sh anafülaktilised reaktsioonid), krampe, pearinglust, kõhuvalus muutusi maksafunktsiooni näitajates, hepatiiti (maksapõletik), nõgestõbe, alopeetsiat (juustekadu), eksanteemi (lööve) ja väga rasketeid nahareaktsioone.

Nagu kõik ravimid, võib ka VERMOX põhjustada ülitundlikkusreaktsioone. Seepärast, kui teil tekib mõni järgnevatest sümptomitest nagu nahalööve, nõgeslööve (urtikaaria), angioödem (allergiline turse), pöörduge kohe oma arsti poole.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas VERMOX´it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viiasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida VERMOX sisaldab:

- Toimeaine on mebendasool. Iga tablett sisaldab 100 mg mebendasooli.
- Teised koostisosad on naatriumlaurüülsulfaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat, naatriumsahhariin, talk, maisitärklis ja laktoosmonohüdraat.

Kuidas VERMOX välja näeb ja pakendi sisu

Peaaegu valged, lamedad, lõigatud servadega, kettakujulised, nõrga iseloomuliku lõhnaga tabletid, mille ühele küljele on pressitud märgistus “VERMOX” ja teisel küljel on poolitusjoon. Murdepind on valge.

PVC/Al blister, mis on pakendatud pappkarpi.

Pakendis 6 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Gedeon Richter Plc.

1103 Budapest X

Gyömrői út 19-21

Ungari

Tootja

Janssen Pharmaceutica N.V.,

Beerse,

Belgia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Richter Gedeon Eesti filiaal
Kitsas 8
51003 Tartu
Tel: +372 7427056

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2014