

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Sodium Chloride B. Braun 0,9%, süstelahus Naatriumkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahus ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahuse kasutamist
3. Kuidas Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahust kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahust säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9% SÜSTELAHUS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

See ravim on naatriumkloriid, mida manustatakse süstina.

Ravim sisaldab naatriumkloriidi sellises kontsentratsioonis, mis on sarnane teie organismi enda sooladesisaldusele.

Seda kasutatakse süstitavate ravimite lahustamiseks või lahjendamiseks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9% SÜSTELAHUSE KASUTAMIST

Ärge kasutage Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahust

Ei ole teada seisundeid, mis rangelt välistaksid Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahuse kasutamise.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahusega

- kui teie vere naatriumitase on väga kõrge (hüpernatreemia) või kui teie vere kloriiditase on väga kõrge (hüperkloreemia)

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahus ei oma mõju autojuhtimisele ja masinate käsitlemisele.

3. KUIDAS SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9% SÜSTELAHUST KASUTADA

Seda ravimit kasutatakse süstide ettevalmistamiseks (süstla kaudu manustatavad ravimid).

Kasutatav kogus sõltub lahustatava või lahjendatava ravimi kohta antud juhistest.

Kui te saate Sodium Chloride B. Braun 0,9% rohkem kui ette nähtud

Kui te olete saanud liiga palju lahust, võib teil tekkida vedeliku kuhjumine organismi, naatriumi, kloriidide ja happeliste ainete taseme ülemäärane suurenemine teie veres (veri muutub happeliseks).

Sellisel juhul peatatakse infusioon koheselt. Lisaks antakse teile veetablette, et suurendada uriinieritust. Teie vere elektrolüütide taset jälgitakse pidevalt. Teie arst otsustab ravimite edasise kasutamise või meetmete üle, et normaliseerida teie elektrolüütide taset, vee ja happeluse tasakaalu.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahus põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Siiski ei ole korrektse manustamise tingimustes mingeid kõrvaltoimeid täheldatud.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9% SÜSTELAHUST SÄILITADA

Hoidke Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahust laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahust pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil või kotil või välispakendil.

Ärge kasutage ravimit, kui te märkate, et lahus on hägune või kui te märkate lahuses osakesi või kui mahuti lekib.

Pärast esmast avamist:

Mikrobioloogilisest vaatepunktist lähtudes, tuleb ravim koheselt ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata koheselt, vastutab kasutusaegse aja ja kasutuseelsete säilitustingimuste eest kasutaja ning tavatingimustes ei toiks see olla pikem kui 24 tundi hoituna temperatuuril 2...8 °C.

6. LISAINFO

Mida Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahus sisaldab:

- Toimeaine on naatriumkloriid. Üks ml lahust sisaldab 9,0 mg naatriumkloriidi.
- Abiaine on süstevesi.

Kuidas Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahus välja näeb ja pakendi sisu

Sodium Chloride B. Braun 0,9% on selge, värvitu naatriumkloriidi vesilahus.

Ravim on saadaval:

- Kummikorgiga klaasviaalides, mis sisaldavad 50 ml või 100 ml lahust. 20 viaaliga pakendid.
- Polüetüleenampullides, mis sisaldavad 10 ml või 20 ml lahust. 20 ampulliga pakendid.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloo hoidja ja tootja

B.Braun Melsungen AG

D-34212 Melsungen

Saksamaa

Postiaadress:

B. Braun Melsungen AG

34209 Melsungen, Saksamaa

Tel.: +49/5661/71-0

Fax: +49/5661/71 4567

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloo hoidja kohaliku esindaja poole.

B.Braun Medical OÜ

Kadaka tee 70b

12618, Tallinn

Tel.:(0) 677 12 00

Infoleht on kaasajastatud 2010

Infoleht on koostöölstatud jaanuaris 2015