

Pakendi infoleht: teave kasutajale
Rhinocort Aqua, 64 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon
Budesonidum

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Rhinocort Aqua ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Rhinocort Aqua kasutamist
3. Kuidas Rhinocort Aquat kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Rhinocort Aquat säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Rhinocort Aqua ja milleks seda kasutatakse

Rhinocort Aqua on pump-pihusti, mis sisaldab ravimit - budesoniidi.

Rhinocort Aqua kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse glükokortikosteroidideks ja mis vähendavad põletiku nähtusid.

Rhinocort Aqua vähendab põletiku nähte ja hoiab ära põletiku tekkimist ning nina limaskesta paistetust.

Rhinocort Aquat kasutatakse sesoonse allergilise riniidi ("heinapalaviku"), samuti aastaringse allergilise riniidi raviks ja ennetamiseks ning ninapolüüpide korral sümptomaatiliseks raviks. Rhinocort Aquat tuleb kasutada regulaarselt, nii nagu arst on ette kirjutanud.

2. Mida on vaja teada enne Rhinocort Aqua kasutamist

Ärge kasutage Rhinocort Aquat:

- kui te olete budesoniidi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Rääkige oma arstile, kui teil on esinenud ebatavalisi reaktsioone budesoniidi või mistahes Rhinocort Aqua koostises oleva abiaine suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Rhinocort Aqua kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega

- kui teil on või on olnud tuberkuloos või maksahaigus,
- kui teil on nina seeninfektsioon või herpes.

Rasedus ja imetamine

Kui olete rase või imetate last rinnapiimaga, peate alati olema ettevaatlik ravimite kasutamisel. Ei ole mingeid tõendeid, et Rhinocort Aqua kasutamine oleks avaldanud kahjulikku toimet nii emale kui ka lapsele, kuid siiski tuleb ravimi manustamisest raseduse ajal hoiduda.

Kui olete rasestunud Rhinocort Aqua kasutamise ajal, võtke niipea kui võimalik oma arstiga ühendust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim ei oma toimet autojuhtimise või masinate käsitlemise võimele.

Muud ravimid ja Rhinocort Aqua

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Teavitage oma arsti, eriti kui kasutate seeninfektsioonide vastaseid ravimeid (nt ravimit nimega ketokonasool).

Rhinocort Aqua on mõeldud ainult teie praeguse haiguse raviks. Ärge kunagi kasutage seda ravimit mingi muu haiguse raviks kui just arst pole nii soovitanud. Ärge kunagi andke ravimit kellelegi teisele.

3. Kuidas Rhinocort Aquat kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enne kui asute Rhinocort Aquat esimest korda manustama, on oluline, et loeksite läbi

Kasutamishandri. Handri selgitab teile, kuidas kasutada pihustuspumpa. Järgige handrit hoolikalt.

Riniit

Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed: soovitatav algannus on 256 mikrogrammi ööpäevas. Annuse võib manustada 1 kord ööpäevas (hommikul) või kaheks osaks jagatuna (hommikul ja õhtul). Nt 128 mikrogrammi (2 x 64 mikrogrammi) kumbagi ninasõõrmesse hommikul või 64 mikrogrammi kumbagi ninasõõrmesse hommikul ja õhtul.

Pärast riniidi nähtude vähenemist võib arst ravimi annust vähendada.

Nina polüüpide ravi ja profülaktika. Soovitatav annus on 256 mikrogrammi ööpäevas. Annuse võib manustada korraga hommikul või jagatuna kaheks (hommikul ja õhtul). Pärast soovitud toime saavutamist võib arst ravimi annust vähendada.

Rhinocort Aqua ei taga sümptomite kohest leevenemist. Vahel ilmneb sümptomite leevenemine alles 5...7 tundi pärast ravi alustamist. Rhinocorti täieliku ravitoime ilmnemiseks kulub vähemalt paar päeva (mõnikord kuni 2 nädalat).

Kui teil on hooajaline allergiline riniit ("heinapalavik"), peaksite ravi alustama mõned päevad enne allergilise perioodi algust.

Nina limaskestast tõsise turse korral võib arst pidada vajalikuks kasutada täiendavalt turset alandavat ravimit (nn vasokonstriktorit).

Rhinocort Aqua ei leevenda allergia ilminguid silmades. Kui silmakaebused muutuvad häirivateks, võib arst soovitada teil kasutada silmade sümptomite leevendamiseks teisi ravimeid.

Lapsed tohivad Rhinocort Aquat kasutada ainult täiskasvanute järelevalve all, see kindlustab ravimi korrektse ja arsti poolt ette kirjutatud annuse manustamise.

Kui te kasutate ravimit rohkem kui ette nähtud

Tähtis on, et te kasutate sellist ravimi annust, mis on toodud käesolevas pakendi infolehes või nii, nagu teile on määranud arst. Te peate kasutama täpselt niipalju, kui teie arst teile soovib. Teie haiguse nähud võivad halveneda, kui te kasutate ravimit soovitatust rohkem või vähem.

Kui te unustate ravimit kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Pihustage järgmine annus nii nagu teile on määratud.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tavaliselt ei kaasne Rhinocort Aqua kasutamisele ebasoovitavaid kõrvaltoimeid. Tekkivad kõrvaltoimed on tavaliselt möödukad ja kestavad lühikest aega. Teatage kindlasti oma raviarstile kui teil tekib mõni alljärgnevatest kõrvaltoimetest:

Sagedased kõrvaltoimed (rohkem kui ühel patsiendist sajast ning vähem kui ühel patsiendil kümnest):

- lokaalne ärritus, veidi verine ninaeritis, ninaverejooks.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: (rohkem kui ühel patsiendil tuhandest ning vähem kui ühel patsiendil sajast):

- ülitundlikkusreaktsioonid nt angioödeem e lokaalne nahaturse;
- nõgestõbi, lööve, nahapõletik, kihelus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed: (vähem kui ühel patsiendil kümnest tuhandest):

- ninavaheseina mulgustumine, nina limaskesta haavandumine;
- anafülaktiline reaktsioon;
- häälekähedus.

Ligikaudu 5% patsientidest võib kogeda lokaalseid ärritusnähte.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Rhinocort Aquat säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast kasutamist asetage pruun kaitsekork alati Rhinocort Aqua pudelile tagasi.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rhinocort Aqua sisaldab:

- **Toimeaine** on budesoniid.
- **Teised koostisosad** on mikrokristalliline tselluloos naatriumkarboksümetüülselluloosiga, veevaba glükoos, polüsorbaat 80, dinaatriumedetaat, kaaliumsorbaat (E202), soolhape, puhastatud vesi.

Kuidas Rhinocort Aqua välja näeb ja pakendi sisu:

Rhinocort Aqua 64 mikrogrammi/annuses: üks pihustus sisaldab 64 mikrogrammi budesoniidi.
Pakendi suurus: Pihusti pudel sisaldab 120 ravimannust.

Müügiloa hoidja

AstraZeneca AB
S-151 85 Södertälje
Rootsi

Tootjad

AstraZeneca AB
Forskargatan 18
S-151 85 Södertälje
Rootsi

Või

Corden Pharma GmbH
Otto-Hahn-Strasse
68723 Plankstadt
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AstraZeneca Eesti OÜ, Järvevana tee 9, 11314 Tallinn
Tel: +372 6549 600

Infoleht on viimati koostöölstatud detsembris 2014

7. KASUTAMISJUHEND

Lugege infolehte enne Rhinocort Aqua ninasprei kasutamist. Kasutamisel järgige hoolikalt allpool toodud instruksioone.

NB! Enne Rhinocort Aqua ninasprei esmakordset kasutamist loksutage pihustuspudelit mõned korrad ja seejärel pihustage 5...10 korda õhku kuni ühtlase ravimijoa saamiseni (vt joonist). Kui te ei kasuta ravimit igapäevaselt, tuleb pihustit jälle laadida. Edasisel kasutamisel piisab ühest õhku pihustusest.

Nuusake nina.
Loksutage pudelit.
Eemaldage pruun kaitsekork.

Hoidke pudelit nii nagu on näidatud joonisel.

Asetage pihusti otsik ninasõõrmesse ning pihustage vajalik kord annuseid. Samamoodi manustage ravimit ka teise ninasõõrmesse.

Asetage pruun kaitsekork tagasi. Ärge kasutage Rhinocort Aquat sagedamini, kui teile on määratud.

Puhastamine

Puhastage pealmisi plastikosaid regulaarselt. Eemaldage nii pruun kaitsekork kui valge ninaotsik. Peske plastikosaid sooja vees. Enne tagasi panemist laske plastikosadel õhu käes täielikult ära kuivada.

Ärge püüdke puhastada pihusti otsikut nõela või terava esemega.